


PARKİNSON HASTALIĐI 200 YAŐINDA



PARKINSON KİMDİR?

- JAMES PARKINSON



- **PARKİNSON HASTALIĐI
TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR
HASTALIKTIR**

PARKİNSON HASTALIĐI TEDAVİSİ

- İLAÇ TEDAVİSİ:

EKSİLEN DOPAMİNİ YERİNE KOYMAYI SAĐLAR

- AİLE DESTEĐİ
- HAREKET VE DÜZENLİ EGZERSİZ
- MORAL VE STRESTEN UZAK DURMA
- DOKTORUNUZLA DOĐRU İLETİŐİM

İLAÇ TEDAVİSİ



- DÜZENLİ İLAÇ KULLANMAK BEYİNDEKİ, DOPAMİN MİKTARININ SÜREKLİ AYNI SEVİYEDE OLMASINI SAĞLAR
- HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ YAVAŞLATIR
- HAREKETLERİMİZİN YUMUŞAK VE RAHAT OLMASINI SAĞLAR
- GÜN İÇİNDE KÖTÜLEŞME ATAKLARI HİÇ OLMAZ VEYA DAHA HAFİF GEÇER

İLAÇLARIMIZ DOĞRU KULLANMAK

AÇ KARNINA KULLANILANLAR

- LEVODOPA
SİNEMET
MADOPAR
DOPALEVO
STALEVO

TOK DA İÇİLEBİLENLER

- DOPAMİN AGONİSTLERİ
PEXOLA REQUIP
PEXA
PARKYN
PARKİPEX...- RASAJİLİN
RASALAS
AZİLECT
NERVOJİL
RAJİL...- AMANTADİN
PK MERZ

İL AÇ TEDAVİSİ YETERSİZ KALIRSA;

- BEYİN PİLİ: DERİN BEYİN STİMÜLASYONU
- BARSAKTAN DOPA VEREN SİSTEM: DUODOPA İNFÜZYONU
- KARIN CİLDİNDEN APO MORFİN VERİLMESİ

BEYİN PİLİ



- HASTALIĞI ORTADAN KALDIRMAZ
- HASTALIĞIN BULGULARINI İLAÇLARLA BİRLİKTE AZALTIR.
- İLAÇ DOZLARI AZALIR, İLAÇLARIN ETKİSİ DAHA UZUN SÜRER VE KÖTÜLEŞME ATAKLARI VE İSTEMSİZ HAREKETLER KAYBOLUR
- İLAÇ DOZ AYARI GİBİ PİL AYARI DA YAPILARAK HASTALIK İLERLEDİKÇE İYİLİK ETKİSİ KORUNUR.

BEYİN PİLİ



• HANGİ HASTALAR BEYİN PİLİ TEDAVİSİNE UYGUNDUR?

1. 70-72 yaşından genç olanlar
2. Unutkanlık bulgusu şiddetli olmayanlar
3. Şeker, tansiyon gibi dahili hastalıkları iyi tedavi edilmiş olanlar
4. Konuşma ve denge sorunu olmayanlar

Beyin filmi, psikiyatri kontrolü sonrası tedaviden faydalanabilirler.

BEYİN PİLİ AŞAMALARI

- HASTANIN TETKİKLERİNİN TAMAMLAMASI
- AMELİYAT SABAHI BAŞA İŞARETLEME ÇERÇEVESİNİN TAKILMASI
- AMALİYATHENEDE KONUŞARAK YAPILAN ELEKTROD YERLEŞTİRMESİ (2-3 SAAT)
- HASTANIN UYUTULARAK ENERJİ KAYNAĞININ GÖĞÜSE YERLEŞTİRİLMESİ
- YAKLAŞIK 1 HAFTA SONRA PİLİN AÇILMASI
- KONTROLLERLE PİLİN AYARLANMASI





BARSAKTAN DOPA TEDAVİSİ



BARSAKTAN DUODOPA

• HANGİ HASTALAR BU TEDAVİYİ KULLANABİLİR?

1. YAŞ SINIRI YOKTUR
2. İLAÇ TEDAVİSİ İLE YETERLİ İYİLİK YOKSA
3. AĞIR PSİKİYATRİK VE BUNAMA BULGULARI YOKSA

• TEDAVİNİN AŞAMALARI:

1. ENDOSKOPI İLE AĞIZDAN İNCE BİR HORTUMLA SİSTEMİN TAKILMASI
2. İLAÇ DOZUNUN AYARLANMASI VE
3. HASTA, HASTA YAKINI EĞİTİMİ

AĞIZDAN İÇİLEN İLAÇLAR TAMA YAKIN KESİLİR, İHTİYAÇ OLAN DOPA SİSTEMDEN ALINIR.

KARIN CİLDİNDEN APO GO



AİLE

AİLE DESTEĞİ İÇİN;

PAYLAŞMAK

DİNLEMEK

ANLAMAK

ÇÖZÜM İÇİN YOL
GÖSTERMEK

BİRLİKTE VAKİT
GEÇİRMEK

